



**NASIONALE
SENIORSERTIFIKAAT**

GRAAD 12

SEPTEMBER 2023

**LANDBOUWETENSKAPPE V1
NASIENRIGLYN**

PUNTE: 150

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 11 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	B ✓✓		
	1.1.2	A ✓✓		
	1.1.3	D ✓✓		
	1.1.4	B ✓✓		
	1.1.5	C ✓✓		
	1.1.6	B ✓✓		
	1.1.7	C ✓✓		
	1.1.8	A ✓✓		
	1.1.9	C ✓✓		
	1.1.10	D ✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	Beide A en B ✓✓		
	1.2.2	Slegs A ✓✓		
	1.2.3	Slegs B ✓✓		
	1.2.4	Geeneen ✓✓		
	1.2.5	Slegs A ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.3	1.3.1	Biologiese waarde ✓✓		
	1.3.2	Bestaansboerdery ✓✓		
	1.3.3	Distosie ✓✓		
	1.3.4	Limfatiese stelsel ✓✓		
	1.3.5	Verlies aan libido ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.4	1.4.1	Voervloei ✓		
	1.4.2	Chronies ✓		
	1.4.3	Skrotum ✓		
	1.4.4	Plasenta ✓		
	1.4.5	Inplanting ✓	(5 x 1)	(5)
TOTAAL AFDELING A:				45


AFDELING B**VRAAG 2: DIEREVOEDING****2.1 Spyskanaal van plaasdiere**

- 2.1.1 **Naam van die deel**
Dunderm ✓ (1)
- 2.1.2 **TWEE sigbare aanpassingskenmerke**
- Teenwoordigheid van mikro-villi ✓
 - Teenwoordigheid van bloedkapillêre ✓
 - Teenwoordigheid van limfvate ✓ (Enige 2 x 1) (2)
- 2.1.3 **Aanduiding van voedingstowwe wat in:**
- (a) **Limf** – verteerde vette ✓ (1)
- (b) **Bloedkapillêre** – verteerde koolhidrate ✓ (1)
- 2.1.4 **Verduideliking van hoe voue bydra tot absorpsie**
Voue vergroot die oppervlakte ✓ vir absorpsie ✓ (2)

2.2 Voer komponente

- 2.2.1 **Identifikasie van**
- (a) **Energie-ryk konsentraat** – Mieliemeel ✓ (1)
- (b) **Proteïen-ryk ruvoer** – Lusernhooi ✓ (1)
- 2.2.2 **Tipe dier**
Herkouer ✓ (1)
- 2.2.3 **Rede**
- Die herkouer het mikro-organismes ✓ wat 'n rantsoen wat ruvoer en ureum bevat, kan verteer ✓
 - Die herkouerdier kan die voer vir die herkou ✓ van ruvoer herleef ✓
 - Die herkouerdier het vier kompartemente ✓ in sy maag wat aangepas is om ruvoer te verteer ✓ (2)
- 2.2.4 **Komponent van die rantsoen wat smaaklikheid en verteerbaarheid van hawerhooi kan verbeter**
Melasse ✓ (1)

2.2.5 Staafgrafiek



KRITERIA/RUBRIEK/NASIENRIGLYN

- Korrekte opskrif ✓
 - Staafgrafiek ✓
 - *x*-as: korrek gekalibreer en gemerk (voerkomponente) ✓
 - *y*-as: Korrek gekalibreer en gemerk (Hoeveelhede) ✓
 - Korrekte eenheid (kg) ✓
 - Akkuraatheid (80% + korrek geplot) ✓
- (6)

2.3 Sog en haar varkies gehuisves in 'n jongingstal met 'n sementvloer

2.3.1 **Mineraalelement gebrek aan in sog**
Yster/Fe ✓ (1)

2.3.2 **EEN tekortsimptoom van yster**

- Bloedarmoede/anemie ✓
- Bleekheid van die slymvliese ✓
- Lusteloosheid/luiheid/moegheid ✓

(Enige 1 x 1) (1)

2.3.3 **Metode om yster aan te vul**

- Inspuiting ✓
- Grond sooie geplaas in varke se sement hok ✓
- Voeding met groen voer ✓

(Enige 1 x 1) (1)

2.4 Pearson-vierkant

2.4.1 **Verhouding wat sonneblomoliekoekmeel verteenwoordig**
8 ✓ (1)

2.4.2 **Rede**
'n Voer wat hoog in proteïen is ✓ vorm 'n klein deel van die verhouding in die mengsel. ✓ (2)

2.4.3 **Berekening van die persentasie van 'n koolhidraatryke voer in die mengsel.**
 $8 + 20 = 28$ ✓
 $= \frac{20}{28} \times 100$ ✓
 $= 71,43\%$ ✓ (3)

2.5 Energiewaardes van 'n voer

2.5.1 **Identifiseer die energieverlies in B**
Energieverlies as liggaamshitte ✓ (1)

2.5.2 **Regverdiging van die belangrikheid van netto energie**

- Benodig vir produksie/groei/reproduksie ✓
- Benodig vir onderhoud ✓

 (2)

2.5.3 **Berekening van metaboliese energie**
 Metaboliese energie/ME =
 = Bruto energie – energieverlies in mis – energieverlies in urine en fermentasiegasse
 $= 24J - 9J - 5J$ ✓
 $= 10J$ ✓

OF

= Verteerbare energie – energieverlies in urine en fermentasiegasse
 $= 15J - 5J$ ✓
 $= 10J$ ✓ (2)

2.5.4 **TWEE doelwitte om die energiewaarde van die voer te bereken**

- Om die dier se dieet te bepaal ✓
- Om voedingstandaarde te bepaal ✓
- Om rantsoenformulering te bepaal ✓

 (Enige 2 x 1) (2)

[35]

VRAAG 3: DIEREPRODUKSIE, BESKERMING EN BEHEER**3.1 Hanteringsfasiliteite**

- 3.1.1 **Identifikasie van die fasiliteit**
Laaibank ✓ (1)
- 3.1.2 **Doel van fasiliteit gemerk A/drukgang**
- Om plaasdiere te bedwing ✓
 - Om plaasdiere na die voertuig te lei vir vervoer ✓ (1)
- 3.1.3 **Ontwerpkenmerk van 'n drukgang om veiligheid te verseker**
- Het hoë soliede/sterk kante om te verhoed dat diere uitkyk ✓
 - Dit het kurwes wat nie skerp is nie ✓
 - Daar is niks wat diere kan benadeel/seermaak nie ✓
 - Hoeke is nie te steil nie ✓ (Enige 2 x 1) (2)
- 3.1.4 **TWEE redes om plaasdiere met drukgang te hanteer**
- Vir dieregesondheidsprogramme ✓
 - Normale bestuursprogram/onthoring/kastrasie/merk/sterte afsit ✓
 - Behandeling van parasiete ✓
 - Bepaling van diere se ouderdom ✓
 - Generering van data ✓
 - Vervoer van diere ✓ (Enige 2 x 1) (2)

3.2. Dierehantering

- 3.2.1 **Aanduiding van die letter**
- (a) A ✓ (1)
- (b) D ✓ (1)
- (c) C ✓ (1)
- 3.2.2 **Gedrag wanneer by blindekol genader**
- Dit sal skop ✓
 - Dit sal rusteloos/ongemaklik wees ✓ (1)
- 3.2.3 **TWEE algemene gedrag wat deur beeste onder stres getoon word**
- Gespitste of verhoogde ore ✓
 - Vinnige stertbeweging ✓
 - Verhoogde hare op die agterkant van die nek ✓
 - Pote kap ✓
 - Snork ✓
 - Geveinsde aanval bewegings ✓ (Enige 2 x 1) (2)

3.3 Skuiling en behuising van plaasdiere**3.3.1 Doel van die gebruik van die strukture**

(a) **Vangkraal** – Om diere tydelik aan te hou voor hantering ✓

(b) **Jongingstal** – Aanhou van sôe en varkies ✓

(c) **Skuur** – Hou diere vir 'n lang tydperk aan om hulle teen temperatuurveranderinge te beskerm ✓ (3)

3.3.2 DRIE redes vir skuiling/behuising in diereproduksie

- Om diere teen uiterste temperatuurveranderinge te beskerm ✓
- Om diere teen roofdiere/diewe te beskerm ✓
- Vir maklike hantering ✓ (3)

3.4 Dieresiektes**3.4.1 Etikettering**

A – Hondsdolheid ✓

B – Bakterieë ✓

C – Geswelde uier ✓

– Melk is dik, vlokkerig en klonte ✓ (Enige 1 x 1)

D – Koksidiose ✓

E – Higiëne ✓ (5)

3.4.2 Identifikasie van die rol van:

(a) Die boer – Goeie higiëniese beginsels ✓ (1)

(b) Die staat – Voorsiening van immunisering/inenting ✓ (1)

3.5 Metodes om medisyne aan diere toe te dien**3.5.1 Identifisering van metodes om medisyne toe te pas**

A – Aktueel ✓

B – Vaginale invoeging ✓

D – Dompeldip/Dip ✓ (3)

3.5.2 Letter wat die metode verteenwoordig wat gebruik word om parasiete te behandel

(a) **Rondewurm** – C ✓ (1)

(b) **Blou bosluise** – D ✓ (1)

3.5.3 TWEE maniere om medikasie volhoubaar te gebruik

- Medisyne is veilig om vir die spesifieke dier te gebruik ✓
- Gaan die vervaldatum na ✓
- Verseker behoorlike berging ✓
- Dien die korrekte dosis toe ✓
- Dien toe volgens die instruksies ✓
- Dien medisyne toe vir die korrekte tydperk om die doeltreffendheid daarvan te verseker ✓
- Maak voorsiening vir behoorlike onttrekkingsperiode voordat dit verbruik word ✓
- Medisyne word weg van kinders gehou ✓ (Enige 2 x 1) (2)

3.6 Giftige plante**3.6.1 EEN giftige plant wat in weivelde gevind word**

- stinkblaar/olieboom/doringappel ✓
- Slangkop ✓
- Lantana ✓
- Duiwelsdoring ✓
- Lupiene ✓
- Buffels gras ✓
- Giftige blaar ✓ (Enige 1 x 1) (1)

3.6.2 TWEE maatreëls om plantgif in weidings te beheer

- Verwyder diere uit 'n besmette kamp ✓
- Verwyder giftige plante uit die weivelde ✓
- Voer diere goed, want hulle sal minder geneig wees om giftige plante te eet ✓
- Vermy oorbeweiding/oorbesetting ✓
- Oefen wisselweiding ✓
- Voorsien diere van voer en water wanneer hulle per spoor vervoer word/wanneer hulle na 'n nuwe plek met onbekende plante bekendgestel word ✓
- Beheer giftige plante deur chemikalieë in besmette weivelde toe te dien ✓ (Enige 2 x 1) (2)

[35]

VRAAG 4: DIEREREPRODUKSIE**4.1 Voortplantingstelsel****4.1.1 Identifikasie van die letter**

- (a) B ✓ (1)
- (b) D ✓ (1)
- (c) E ✓ (1)

4.1.2 TWEE aangebore defekte in deel B/testis wat tot verlies aan vrugbaarheid lei

- Hipoplasie ✓
- Kriptorgidisme ✓
- Sperm defek ✓ (Enige 2 x 1) (2)

4.1.3 Rol gespeel deur deel gemerk C/penis in voortplanting

Dit plaas semen in die vagina tydens paring ✓ (1)

4.2 Hormone wat estrussiklus beheer**4.2.1 Duur van die estrus**

28 dae ✓ (1)

4.2.2 Naam van die hormone

A – Estrogeen ✓
B – Progesteron ✓ (2)

4.2.3 Aanduiding van wat tydens die follikulêre fase gebeur

- (a) Stadium van estrussiklus – Pro-estrus ✓
- (b) Hormoon verantwoordelik – FSH ✓ (2)

4.2.4 TWEE funksies van hormoon B/progesteron as die koei dragtig kan wees.

- Vertraag afskeiding van FSH ✓
- Verhoed dat koei op hitte kom ✓
- Berei die uterus voor om die bevrugte eiersel te ontvang ✓
- Handhaaf behoorlike uteriene omgewing om swangerskap te handhaaf ✓
- Stimulering van baarmoeder/uterusmelkafskeidings ✓ (Enige 2 x 1) (2)

4.3 Kunsmatige inseminasie

4.3.1 Doel van die gebruik van pistolette

Om semen tydens kunsmatige inseminasie te deponeer ✓ (1)

4.3.2 TWEE basiese vereistes vir berging

- Semen moet vir 'n kort tydperk by 5°C gestoor word ✓
- Semen word gevries in vloeibare stikstof by -196°C gehou indien dit vir langer tyd gestoor word ✓
- Moet in polivinielstrooitjies gestoor word ✓
- Die einde van strooitjies is verseël om te verhoed dat vloeibare stikstof binnedring ✓
- Strooitjies moet gemerk word vir identifikasie ✓ (Enige 2 x 1) (2)

4.3.3 Identifikasie van die letter

(a) A ✓ (1)

(b) E ✓ (1)

4.3.4 EEN nadeel van die gebruik van die toerusting vir die boer

Dit is duur ✓ (1)

4.3.5 TWEE voordele van kunsmatige inseminasie

- Verminder die voorkoms van seksueel oordraagbare siektes ✓
- Meer vroulike diere kan deur superieure/voortreflike manlike diere bevrug word ✓
- Dit is 'n vinnige en ekonomiese manier om die kudde te verbeter ✓
- Semen van manlike diere in ander lande kan gebruik word ✓
- Semen van superieure/voortreflike bulle kan selfs na dood gebruik word ✓
- Dit verbeter die kommersiële waarde van die kudde ✓
- Semen van meervoudige vaars kan gebruik word sonder om duur bulle aan te hou en te onderhou ✓ (Enige 2 x 1) (2)

4.4 Embrio-oes/spoeling

4.4.1 Identifikasie van die prosedure

Embrio-oes/spoeling ✓ (1)

4.4.2 Tipe koei waar die prosedure uitgevoer word

Donor/Superieure koei ✓ (1)

4.4.3 Rede

Dit beskik oor geneties superieure wenslike eienskappe ✓ (1)

4.4.4 EEN doel van embrio-oorplanting/EO

- Om uitwissing van waardevolle diere te voorkom/aantal bedreigde spesies te verhoog ✓
- Om siekteweerstand te verbeter deur gebruik te maak van embrio's van voortreflike diere wat weerstand teen sekere siektes is ✓
- Om die groeitempo en produksie-opbrengste te verbeter ✓

(Enige 1 x 1) (1)

4.4.5 TWEE nadele van die tegniek vir die boer

- Duurder/arbeidsintensief ✓
- Benodig aansienlike vaardigheid en ondervinding ✓
- Synchronisasie van die ontvanger en donor/skenker kan moeilik wees ✓
- Ontvanger-koei mag nie swanger raak nie / aborsie kan voorkom ✓
- Ontvangers het dalk nie 'n sterk genoeg hitesiklus om die inseminasie te aanvaar nie ✓
- Die gevaar bestaan dat ontvangers die embrio's kan aborteer ✓
- Tydrowend ✓

(Enige 2 x 1) (2)

4.5 Vloei van melk

4.5.1 Herrangskikking van die stappe waarmee die melk sal vloei

- Alveolus ✓
- Melkbuis ✓
- Klierbak ✓
- Speenbak ✓
- Speenkanaal ✓

(5)

4.5.2 Melkaflaatproses

(a) TWEE stimuli wat die proses laat begin

- Was van die uier ✓
- Massering van die uier ✓
- Melkaksie ✓
- Voorkoms en klank van die melker ✓
- As die kalf gesien word

(Enige 2 x 1) (2)

(b) Hormoon betrokke

- Oksitosien ✓

(1)

[35]

TOTAAL AFDELING B: 105

GROOTTOTAAL: 150